

本ページでは当院で登録されているがん化学療法レジメン(注射薬を含む治療)について、がん化学療法を受ける患者さんの安全性向上を目的に公開しています。

子宮頸がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
CDDP+放射線療法	シスプラチン	40mg/m ²	点滴静注 day1、8、15、22、29	35日
	放射線療法	2Gy	day1~5、8~12、15~19、22~26、29~33	
TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)+ペムブロリスマブ(3週毎)+Bev療法 (7クール目以降はペムブロリスマブ+Bev)	ペムブロリスマブ	200mg/body	点滴静注 day1	21日
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 day1	
	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	
	カルボプラチン	AUC5(max750mg/body)	点滴静注 day1	
	カルボプラチン	AUC5(max750mg/body)	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)+ペムブロリスマブ(3週毎)療法 (7クール目以降はペムブロリスマブ単剤)	ペムブロリスマブ	200mg/body	点滴静注 day1	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	
	カルボプラチン	AUC5(max750mg/body)	点滴静注 day1	
	カルボプラチン	AUC5(max750mg/body)	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)+Bev療法	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC5(max750mg/body)	点滴静注 day1	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 day1	
セミプリマブ(リブタヨ)	セミプリマブ	350mg/body	点滴静注 day1	21日

卵巣がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
DC(DTX+CBDCA)	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)+BV(術後補助療法) ※1クールはTC、2-6クールはTC+BV、7-22クールはBV単剤	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注 day1	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)+BV(術後補助療法は除く) ※1-6クールはTC+BV、7-22クールはBV単剤	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC6	点滴静注 day1	
	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 day1	
CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	21日

CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注 day1、8、15	28日
CPT-11+CDDP	イリノテカン	60mg/m ²	点滴静注 day1、8、15	28日
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 day1	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 day1、8、15	28日
liposomal DXR+BV	リポソーム化ドキシソルビシン	40mg/m ²	点滴静注 day1	28日
	ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 day1、15	
CBDCA+liposomal DXR+BV ※1-6クールは3剤、7クール目以降はBV単剤	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	28日
	リポソーム化ドキシソルビシン	30mg/m ²	点滴静注 day1	
	ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 day1、15 (7クール目以降は1クール21日)	

卵管がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
liposomal DXR+BV	リポソーム化ドキシソルビシン	40mg/m ²	点滴静注 day1	28日
	ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 day1、15	

腹膜がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
liposomal DXR+BV	リポソーム化ドキシソルビシン	40mg/m ²	点滴静注 day1	28日
	ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 day1、15	

胚細胞腫瘍 レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
準備中				

子宮体がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
AP(DXR+CDDP)	ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	シスプラチン	50mg/m ²	点滴静注 day1	
TC(PTX+CBDCA)	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	カルボプラチン	AUC5	点滴静注 day1	
ペムプロロズマブ+パバキーマブ	ペムプロロズマブ	200mg/body	点滴静注 d1	21日

レムバチニブ	20mg/body	経口 連日内服	414
--------	-----------	---------	-----

絨毛性腫瘍 レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
MTX+FA	メトレキサート	1mg/kg	筋注 day1、3、5、7	18~22日
	ロイコボリン	0.1mg/kg	筋注 day2、4、6、8	
5-dayMTX	メトレキサート	0.4mg/kg(最大25mg/日)	筋注 day1、2、3、4、5	14日
ACT-Dパルス	アクチノマイシンD	1.25mg/m ² (最大2mg/日)	点滴静注 day1	14日
5-day ACT-D	アクチノマイシンD	0.01mg/kg(最大2mg/日)	点滴静注 day1、2、3、4、5	14日

子宮肉腫 レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
DXR	ドキソルビシン	75mg/m ²	点滴静注 day1	21日
IA(DXR+IFM)	ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴静注 day1	28日
	イホスファミド	1500mg/m ²	点滴静注 day1、2、3、4	

子宮癌肉腫 レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
IT(IFM+PTX)	パクリタキセル	135mg/m ²	点滴静注 day1	21日
	イホスファミド	1.6g/m ²	点滴静注 day1、2、3	
		(放射線の前治療ある場合は1.2g/m ²)		
	メスナ	2g	点滴静注 day1、2、3	
	ペグフィルグラスチム	3.6mg/body	day4	
IP(IFM+CDDP)	イホスファミド	1500mg/m ²	点滴静注 day1、2、3、4	21日
	シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注 day1、2、3、4	

2024.3更新