

本ページでは当院で登録されているがん化学療法レジメン(注射薬を含む治療)について、がん化学療法を受ける患者さんの安全性向上を目的に公開しています。

## 胃がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	21日
IRI	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
IRI+RAM	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	d1	14日
	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 d1	
nab-PTX(A法)	パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	21日
Weekly nab-PTX	パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
Weekly PTX	パクリタキセル	60~80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
SOX(S1+L-OHP)	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
G-SOX(S1+L-OHP)	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	オキサリプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
SOX(S1+L-OHP)+T-mab	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注 d1	
SOX(S1+L-OHP)+ニボルマブ	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	ニボルマブ	360mg/Body	点滴静注 d1	
S1+CDDP	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-21	35日
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d8	
S1+CDDP+T-mab	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-21	35日
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d8	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注 d1	

S1+DTX	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25㎡以上～1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	ドセタキセル	40mg/㎡	点滴静注 d1	
S1+DTX(術後補助化学療法)	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25㎡以上～1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回	1～7クール目:d1-14内服、d 15-21休薬 8クール目以降:d1～28内服、 d29～42休薬	1～7クール 目:21日 8クール目 以降:42日
	ドセタキセル	40mg/㎡	d1	
S1+T-mab	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25㎡以上～1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-28	42日
	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注 d1(21日毎に投与)	
CapeOX(Cape+L-OHP)	カペシタビン	体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36㎡以上～1.66㎡未満 1500mg/回 1.66㎡以上～1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1夕-15朝	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注 d1	
CapeOX(Cape+L-OHP)+ニボルマブ	カペシタビン	体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36㎡以上～1.66㎡未満 1500mg/回 1.66㎡以上～1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1夕-15朝	21日
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注 d1	
	ニボルマブ	360mg/Body	点滴静注 d1	
XP(Cape+CDDP)	カペシタビン	体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36㎡以上～1.66㎡未満 1500mg/回 1.66㎡以上～1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1夕-15朝	21日
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注 d1	
XP(Cape+CDDP)+T-mab	カペシタビン	体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36㎡以上～1.66㎡未満 1500mg/回 1.66㎡以上～1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1夕-15朝	21日
	シスプラチン	80mg/㎡	点滴静注 d1	
	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注 d1	
ニボルマブ (2週間間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注 d1	14日
ニボルマブ (4週間間隔)	ニボルマブ	480mg/Body	点滴静注 d1	28日

RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 d1、15	28日
PTX+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 d1、15	28日
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	
PTX+T-mab	トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注 3週間に1回	Tmab 21日 PTX 28日
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 週に1回を3週行い1週間休薬	
nab-PTX+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 d1、15	28日
	パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	
FOLFOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1-2(46時間)	

2024.3更新