

本ページでは当院で登録されているがん化学療法レジメン(注射薬を含む治療)について、がん化学療法を受ける患者さんの安全性向上を目的に公開しています。

## 膵がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1-2(46時間)	
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
GEM+放射線療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
	放射線治療		土日・祝日を除く毎日	
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
	パクリタキセル注射剤(アルブミン懸濁型)	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	
術前GEM+S-1	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8	21日
	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	
GEM+エルロチニブ	エルロチニブ	100mg/Body	1日1回空腹時 経口 連日	28日
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	
modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	14日
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1-3	
オニバイド+FF療法	イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1-3	

## 肝細胞がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 d1	14日
アテゾリズマブ+ベバシズマブ	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注 d1	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 d1	
デュバルマブ	デュバルマブ	1500mg/body	点滴静注 d1	28日

## 胆道がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8、15	28日
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8	21日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8	
S-1+GEM	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	21日
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d8、15	
GCS療法(GEM+CDDP+S-1)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	14日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1	
	テガフル/ギメラシル/ウラシル	体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-7	
GEM+CDDP+デュバルマブ ※9クール目以降はデュバルマブ単剤のみ	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8	21日(1～8クール) 28日(9クール目以降)
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 d1、8	
	デュバルマブ	1500mg/body	点滴静注 d1	

2024.3更新