

本ページでは当院で登録されているがん化学療法レジメン(注射薬を含む治療)について、がん化学療法を受ける患者さんの安全性向上を目的に公開しています。

乳がん レジメン

レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量	用法	1コース
CMF(MTX+CPA+5FU)	メトトレキサート	40mg/m ²	点滴静注 d1、8	28日
	シクロfosファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1、8	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注 d1、8	
AC(DXR+CPA)	ドキソルビシン	60mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	
EC(EPI+CPA)	エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	
dose dense EC	エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注 d1	14日
	シクロfosファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	
	ペグフィルグラスチム	3.6mg/body	d2以降に1回	
CAF(DXR+CPA+5FU)	ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	500mg/m ²	点滴静注 d1	
	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 d1	
CTF(THP-ADM+CPA+5FU)	ピラルビシン	50mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	500mg/m ²	点滴静注 d1	
	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 d1	
DTX	ドセタキセル	60~70mg/m ² (最大75mg/m ²)	点滴静注 d1	21日
DXR	ドキソルビシン	20mg/m ²	点滴静注 d1	7日
EPI	エピルビシン	20~30mg/m ²	点滴静注 d1	7日
FEC(EPI+CPA+5FU)	エピルビシン	60~100mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	500mg/m ²	点滴静注 d1	
	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 d1	
GEM	ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注 d1、8	21日
GEM+PTX	ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注 d1、8	21日
	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 d1	
weekly GEM+PTX	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 d1、8	21日
	パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 d1、8	
nab-PTX	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注 d1	21日
PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 d1	21日
PTX+BV	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注 d1、8、15	28日
	ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 d1、15	
TC(DTX+CPA)	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロfosファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	

TC(THP-ADM+CPA)	ピラルビシン	60mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	シクロフォスファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	
トラスツズマブ	トラスツズマブ	A法:初回 4mg/kg A法:2回目以降 2mg/kg	点滴静注 d1	7日
	トラスツズマブ	B法:初回 8mg/kg B法:2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	
VNR	ビノレルピン	25mg/m ²	点滴静注 d1、8	21日
weekly DTX	ドセタキセル	35~40mg/m ²	点滴静注 d1	7日
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 d1	7日
XT(DTX+Cap)	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 d1	21日
	カペシタビン(B法)	1.33m ² 未満:1500mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	
		1.33m ² 以上1.57m ² 未満:1800mg/回		
		1.57m ² 以上1.81m ² 未満:2100mg/回		
	1.81m ² 以上:2400mg/回			
エリブリン	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注 d1、8	21日
トラスツズマブ エムタンシン	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注 d1	21日
トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注 d1	21日
トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	点滴静注 d1	
	ドセタキセル	60~75mg/m ²	点滴静注 d1	
トラスツズマブ+ペルツズマブ+AI	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	点滴静注 d1	
	アロマターゼ阻害薬(ANA又はLET)		1日1回 1回1錠 経口 連日	
トラスツズマブ+ペルツズマブ+Cap(※)	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	点滴静注 d1	
	カペシタビン(1000mg/m ² /回)	1.36m ² 未満:1200mg/回	1日2回朝夕食後 経口 d1-14	
		1.36m ² 以上1.66m ² 未満:1500mg/回 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:1800mg/回 1.96m ² 以上:2100mg/回		

トラスツズマブ+ペルツズマブ+nab-PTX	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	点滴静注 d1	
	ナブパクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注 d1	
トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ペルツズマブ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	点滴静注 d1	
	エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注 d1、8	
TC(DTX+CPA)+Tmab	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	点滴静注 d1	21日
	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 d1	
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 d1	
アテゾリズマブ+nab-PTX	アテゾリズマブ	840mg	点滴静注 d1、15	28日
	nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注 d1、8、15	

2023.11更新